

Chez les patients qui présentent une **diminution de l'acidité gastrique** (achlorhydrie ou prise de médicaments qui diminuent l'acidité gastrique), on recommande donc de prendre l'itraconazole avec une **boisson acide** (p.ex Coca Cola®).

Les anti-inflammatoires

Tous les AINS peuvent provoquer des effets indésirables gastro-intestinaux sévères, parfois sans symptômes préalables. La question de savoir dans quelle mesure ce risque varie d'un AINS à un autre reste l'objet de discussions.

- Le piroxicam et le kétorolac présenteraient un risque plus élevé d'effets indésirables gastro-intestinaux et de complications d'ulcères telles que hémorragie et perforation.
- Avec l'ibuprofène et les AINS COX-2 sélectifs, le risque d'ulcère et de complications d'ulcère serait plus faible qu'avec les autres AINS.

Ces lésions gastro-intestinales surviennent peu importe la voie d'administration des AINS, même par voie parentérale et rectale, et donc peu importe le moment de prise (voir 9.1.1. AINS à usage systémique).
Pour la plupart des anti-inflammatoires, le moment de prise est indifférent en ce qui concerne la pharmacocinétique. La prise avec de la nourriture n'influence donc pas l'effet ulcérogène qui est médié via les prostaglandines.
Le fait de les prendre avec de la nourriture permet donc uniquement de réduire le risque d'irritation de l'estomac.⁵
Habituellement, par prudence, il est donc conseillé de prendre les AINS pendant le repas.

Médicaments contre le diabète

Metformine

La metformine est à prendre **pendant ou après le repas** (RCP).^{3,4} En effet, la prise de metformine au cours d'un repas **diminue le risque d'effets indésirables gastro-intestinaux**.²
Pour rappel, des doses excessives d'alcool peuvent entraîner un risque accru **d'acidose lactique** (voir 5.1.2. Metformine).

Sulfamidés hypoglycémiants et glinides

Ces molécules stimulent la production d'insuline. Dans ce contexte, le moment de prise par rapport au repas est important afin d'adapter la réponse précoce de l'insulinosécrétion au pic glycémique lié au repas et de limiter l'hyperglycémie postprandiale.

Les sulfamidés hypoglycémiants avec une courte durée d'action (gliquidone) doivent être pris **20 à 30 minutes** avant le repas. Les préparations à longue durée d'action (glibenclamide, gliclazide à libération modifiée, glimépiride) peuvent être prises **juste avant ou pendant** le repas, habituellement le petit-déjeuner.

Les glinides sont habituellement administrés 15 minutes avant le repas, **ou maximum 30 minutes avant le repas** (RCP).^{2,3,4}

Chaque médicament au bon moment : résumé.

Administration (le matin) à jeun	Administration autour d'un repas
----------------------------------	----------------------------------

• Inhibiteurs de pompe à protons (IPP) <i>Insister sur la prise d'un repas après l'administration d'un IPP.</i> • Fer <i>1h avant ou 2h après le repas (pendant le repas si troubles gastro-intestinaux).</i> <i>Attendre 2 à 3 heures avant de prendre des bisphosphonates, de la lévodopa, de la l�vothyroxine, des quinolones, des t�tracyclines, du calcium et des antiacides.</i> • L�vothyroxine <i>30 minutes avant le petit-d�jeuner ou 60 minutes si le petit d�jeuner contient des produits laitiers ou � base de soja.</i> <i>Attendre 3 � 4 heures avant de prendre du fer, du magn�sium, du calcium ou des antiacides.</i> • Bisphosphonates <i>Attendre au moins 30 minutes avant de prendre un aliment, une boisson, du calcium ou tout autre m�dicament.</i>	• Amoxicilline + acide clavulanique • Nitrofuranto�ne <i>De pr�f�rence au moment des repas, avec de la nourriture, du lait ou du yaourt.</i> • M�tronidazole <i>Pas d'alcool pendant le traitement ni pendant au moins 24 heures apr�s arr�t du traitement.</i> • Itraconazole en g�lules <i>Prendre avec une boisson acide si diminution de l'acidit� gastrique (prise d'IPP, d'antiacides...).</i> • Anti-inflammatoires <i>Par prudence, pour r�duire le risque d'irritation de l'estomac, prendre pendant le repas.</i> • Metformine <i>Eviter la consommation excessive d'alcool car il existe un risque d'acidose lactique.</i> • Sulfamid�s hypoglyc�miants avec une longue dur�e d'action <i>Juste avant ou pendant le repas, habituellement le petit-d�jeuner.</i> • Sulfamid�s hypoglyc�miants avec une courte dur�e d'action et glinides <i>15 � 30 minutes avant le repas.</i>
---	---

Sp cialit s

- Acide clavulanique + amoxicilline : Augmentin , Amoxiclav Sandoz , AmoclaveEG , Amoxicillin/Clavulanic Acid AB  (voir R pertoire).
- Nitrofuranto ne : Furadantine MC  (voir R pertoire).
- M tronidazole : Flagyl  (voir R pertoire).
- Itraconazole : Itraconazole(e), Sporanox  (voir R pertoire).
- Ibuprof ne : Ibuprof ne(e), Algidrin , Brufen , Nurofen , Perdofermina , Spidifen  voir R pertoire).
- Metformine : Metformine(e), Metformax  (voir R pertoire).
- Glibenclamide : Daonil  (voir R pertoire).
- Gliclazide : Gliclazide(e), Uni Diamicron , Uni Gliclazide EG  (voir R pertoire).
- Glimepiride : Glimepiride(e) (voir R pertoire).
- Gluquidon : Glurenorm  (voir R pertoire).
- R paglinide : Repaglinide(e), Novonorm  (voir R pertoire).

Sources

- 1 Stockley's Drug Interactions, consult  le 2 janvier 2024.
- 2 Farmacotherapeutisch Kompas, <https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/>, consult  le 3 janvier 2024.
- 3 Martindale – The Complete Drug Reference, consult  le 2 janvier 2024.
- 4 DynaMed, consult  le 9 janvier 2024.
- 5 NHS, Why must some medicines be taken with or after food?, consult  le 23 janvier 2024.

Colophon

Les *Folia Pharmacotherapeutica* sont publiés sous l'égide et la responsabilité du *Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique* (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie) a.s.b.l. agréée par l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS).

Les informations publiées dans les *Folia Pharmacotherapeutica* ne peuvent pas être reprises ou diffusées sans mention de la source, et elles ne peuvent en aucun cas servir à des fins commerciales ou publicitaires.

Rédacteurs en chef: (redaction@cbip.be)

T. Christiaens (Universiteit Gent) et
Ellen Van Leeuwen (Universiteit Gent).

Éditeur responsable:

T. Christiaens - Nekkersberglaan 31 - 9000 Gent.